


S
S
L
A
N
A



ANÁLISIS

alergias
alimentarias
+ cándida y
levaduras

CLÍNICA
VITOLA

alérgias alimentarias + cándida y levadura

Descubriendo sensibilidades alimentarias

Las sensibilidades alimentarias IgG proporcionan una guía útil para dietas personalizadas de rotación/eliminación con impacto clínico asociado con una variedad de enfermedades.

Las personas pueden seguir comiendo alimentos perjudiciales sin ser conscientes de sus posibles efectos adversos, porque los síntomas asociados con la sensibilidad a los alimentos pueden aparecer horas o días después de ingerir el alimento perjudicial.

La prueba IgG Food MAP de MosaicDX es una prueba integral de sensibilidad alimentaria que mide anticuerpos contra 190 alimentos, hierbas y especias comunes que normalmente se encuentran en las dietas occidentales, asiáticas y mediterráneas y también incluye resultados para cándida y levadura.

Al identificar la sensibilidad a los alimentos, esta prueba puede ayudar a las personas a personalizar su dieta, lo que conduce a mejoras en la salud y el bienestar general.

Beneficios

Algunas reacciones que pueden generar los alimentos: ansiedad, cambio de humor, hiperactividad, insomnio, cefalea, cansancio, mareos, dolores articulares o musculares, dificultad respiratoria, mal aliento, trastornos digestivos (diarrea, estreñimiento, cólicos, náuseas, dolor de estómago), erupciones, acné, dermatitis, pérdida de cabello, prurito nasal o generalizado, rinitis, retención de líquidos o aumento de peso.

Nota: se realiza a partir de los 3 años

ANÁLISIS alérgias alimentarias + cándida y levadura

Posibles resultados

Los síntomas más comunes que mejoran (entre un 75 y un 100%) con las dietas de eliminación incluyen asma, tos, zumbido en los oídos, fatiga crónica, dolores de cabeza, gases, distensión abdominal, diarrea, sarpullido, picazón en la piel y congestión nasal.

COMO SE REALIZA EL ANÁLISIS

Es más sencillo de lo que crees.

El proceso se realiza en la clínica, de la forma más rápida, fácil e INDOLORA posible. El análisis se realiza en la clínica. Se toman muestras mediante unas gotas de sangre extraídas del dedo, que luego se depositan en un cartón.

Instrucciones previas

No estar en ayunas

Beba mucha agua.

Es importante que esté bien hidratado. Le recomendamos beber dos o más vasos de 8 oz de agua unas horas antes de la recolección.

Si toma anticoagulantes o medicamentos para algún trastorno hemorrágico, hable con nosotros para ver si puede realizarse esta prueba. Los anticoagulantes más recetados son Coumadin, Plavix, Effient, Brilinta, Pradaxa, Eliquis, Xarelto y aspirina diaria.

Tratamiento con Corticoides: En el caso de estar con corticoides, en cualquiera de sus composiciones deberá de suspenderlo minimo 10 dias

alérgias alimentarias + cándida y levadura

Medicamentos que podrían afectar los resultados del análisis

Mínimo 2 semanas sin consumo de estos medicamentos

Glucocorticoides

(Ej.: prednisona, crema de cortisona, inhaladores para el asma)

Inmunosupresores

(Ej.: Humira)

alérgias alimentarias + cándida y levadura

Inversión

Valor del estudio USD 259

Lo abonará directamente al laboratorio a través del link que se le facilitará luego de la toma de la muestra.

El pago lo realizará con tarjeta de crédito internacional (no se le pedirán los datos en la Clínica)

Costo del kit USD 35 + el envío de FedEx USD 45

Se abona mediante transferencia bancaria

Nota: La realización del estudio NO incluye lectura del mismo. Podrá solicitar turno con la Dra. Vitola para abordar los resultados.

Solicitar análisis

[Click Aquí](#)



+598 91 497 018